

## 注射室常用药物汇总一览表

药品名称	剂量	用法	注射部位	不良反应	禁忌症
醋酸亮丙瑞林微球 (贝依)	3.75mg/支	通常每 4 周 (28 天) 一次, 用助悬剂溶解, <b>皮下注射</b>	上臂三角肌下缘、上臂外侧、腹部、大腿外侧方	面色潮红, 盗汗, 性欲减退, 情绪变化、骨质疏松等 <b>更年期症状</b> , 停止治疗后卵巢功能恢复。	对 GnRH 过敏者禁用, 妊娠和哺乳期妇女禁用
醋酸戈舍瑞林缓释剂 (诺雷得)	3.6mg/支	通常每 4 周 (28 天) 一次, <b>皮下注射</b>	<b>腹前臂壁皮下注射</b>		
醋酸曲普瑞林 (达菲林)	3.75 mg/支	通常每 4 周 (28 天) 一次, <b>肌肉注射</b>	臀大肌注射、上臂三角肌注射		
依诺肝素钠注射液 (克赛)	0.4m , 4000AxaIU	通常 4000AxaIU <b>皮下注射</b>	上臂三角肌下缘、上臂外侧、腹部、大腿外侧方	出血、血小板减少症, 穿刺部位瘀斑、瘀点	过敏者禁用, 出血或严重凝血功能障碍者禁用
重组人类粒细胞刺激因子注射液 (吉赛欣)	0.3ml/75ug	75-150ug <b>皮下注射</b>		<b>骨骼肌酸痛</b> 、食欲不振、转氨酶升高	过敏者禁用, 严重肝肾、心肺功能障碍者禁用

## 注射室常用药物汇总一览表

药品名称	剂量	用法	注射部位	不良反应	禁忌症
注射用绒促性素	1000U/支 2000U/支 5000U/支	用灭菌注射用水稀释后， <b>肌肉注射</b> ，	臀大肌注射、上臂三角肌注射	用于促排时可诱发卵巢囊肿或卵巢肿大，少见者可出现卵巢过度刺激综合征	垂体肿瘤、前列腺癌、性早熟者、未明原因的阴道流血、子宫肌瘤、卵巢囊肿、血栓性静脉炎
注射用尿促性素	75U/支 150U/支	用 1-2ml 氯化钠注射液稀释后， <b>肌肉注射</b>		卵巢过度刺激综合征，刺激后卵泡突然增大，多个卵泡发育，囊肿扭转或破裂	未明原因的阴道流血、子宫肌瘤、卵巢囊肿、肾上腺甲状腺功能不全者
黄体酮注射液	20mg/1ml	20-40mg <b>肌肉注射</b>		胃肠道反应、痤疮、水钠潴留、体重增加	严重肝肾功能损害，未明确诊断的阴道出血
维生素 D2 注射液	20 万 u/1ml	20-40 万 u <b>肌肉注射</b>		便秘腹泻、骨痛、惊厥、高血压	高钙血症、维生素增多症、高磷血症
注射用鼠神经生长因子 (恩经复、金路捷)	18ug/支 20ug/支	每次一支用 2ml 注射用水溶解， <b>肌肉注射</b>	婴幼儿髂前上棘 2-3 横指或上臂三角肌注射	注射部位疼痛	过敏者禁用， <b>2-8° 避光保存</b>