



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

小儿感染科

小儿感染科



流行性腮腺炎



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

小儿感染科

1

定义

2

病原学及流行病学

3

临床表现

4

治疗及护理

定义



流行性腮腺炎是由腮腺病毒引起的急性呼吸道传染病。临床上以腮腺肿大及疼痛为特征，各种腺体及器官均可受累。



病原体：腮腺炎病毒

临床特征：腮腺肿大及疼痛，各种唾液腺体及器官均可受累



传染性较强，一次患病后终身免疫****

腮腺肿大前6天到发病后5天或更长时间均可排毒

传播途径：飞沫传播，或直接接触

易感人群：儿童和青少年

以冬、春季为主

病理特征



受侵犯腺体出现非化脓性炎症

腺体分泌物排出受阻

吃酸的食物疼痛加剧

临床表现



首发表现是腮腺肿大和疼痛

常先一侧肿大，2~3天后波及对侧，伴腮腺管口红肿，肿大腮腺以耳垂为中心，向前、后、下发展，边缘不清，触之有弹性、灼热，张口、咀嚼或吃酸性食物时疼痛加剧

临床表现

可有中度发热、头痛、乏力等

下颌下腺和舌下腺也可同时受累



腮腺肿大



颌下腺受累

并发症



脑膜脑炎

胰腺炎——禁食至腹痛消失

睾丸炎——部分可有睾丸萎缩

其他：卵巢炎、心肌炎、肾炎等

辅助检查



血、尿淀粉酶

血清学检查 病毒特异性的IgM抗体

病毒分离

治疗



无特殊治疗，对症处理

减轻疼痛：

忌酸、硬、辣等刺激性食物

六合丹外敷



- 1 . 按儿科传染病一般护理常规。
- 2 . 飞沫隔离至腮腺肿胀完全消退后3天。
- 3 . 指导患儿休息至腮腺肿大消退，有并发症延长休息时间。
- 4 . 指导进食清淡、易消化、营养丰富的半流质或软食，避免进食酸、辣、硬等刺激性食物。进食后用温盐水漱口，保持口腔清洁。有胰腺炎腹痛者应禁食。



5 . 观察病情变化 观察生命体征；注意有无脑膜脑炎、急性胰腺炎、睾丸炎等临床征象。腮腺肿胀部位可予六合丹外敷，局部疼痛者可间歇性冷敷。发生睾丸炎者用丁字带托起阴囊，局部间歇冷敷以减轻疼痛。

6 . 发热患儿按发热护理常规护理。

7 . 健康教育 有接触史的易感儿应观察3周。做好饮食、口腔护理，减轻疼痛。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

小儿感染科

小儿感染科



THE END !